

## PATIENT WALLET CARD

**Have This Card With You At All Times  
Show It To Any Doctor That Sees You And When  
You Go To The Hospital**

You should plan to stay within 2 hours of the location where you received your treatment for at least 4 weeks after getting Kymriah. Your healthcare provider will check to see if your treatment is working and help you with any side effects that occur.

### Patient Information

Kymriah may cause side effects that are severe or life-threatening. **Call your oncologist or go to the emergency room if these signs appear.**

### SIGNS AND SYMPTOMS MAY INCLUDE:

- Difficulty breathing
- Fever (100.4°F/38°C or higher)
- Severe muscle or joint pain
- Severe nausea, vomiting, diarrhea
- Chills/shaking chills
- Dizziness/light-headedness
- Confusion
- Headache



Novartis Pharmaceuticals Corporation

East Hanover, New Jersey 07936-1080 © 2021 Novartis 02/21 KYD-1238425

## TARJETA PARA BILLETERA DEL PACIENTE

**Tenga consigo esta tarjeta en todo momento  
Muéstresela a cualquier médico que lo vea y cuando  
vaya al hospital**

Debe hospedarse en un lugar que se encuentre a menos de 2 horas de donde recibió tratamiento durante, al menos, 4 semanas después de haber recibido Kymriah. Su proveedor de atención médica verificará si el tratamiento está funcionando y lo ayudará con cualquier efecto secundario que se produzca.

### Información del paciente

Kymriah puede causar efectos secundarios graves o potencialmente mortales.

### LOS SIGNOS Y SÍNTOMAS PUEDEN INCLUIR:

- Dificultad para respirar
- Fiebre (100.4°F/38°C o superior)
- Escalofríos/escalofríos con temblores
- Confusión
- Náuseas, vómitos y diarrea graves
- Dolor muscular o articular grave
- Presión arterial muy baja
- Mareos/vahídos
- Dolor de cabeza



Novartis Pharmaceuticals Corporation

East Hanover, New Jersey 07936-1080 © 2021 Novartis 02/21 KYD-1238425

## INFORMATION FOR THE HEALTHCARE PROVIDER

This patient has received Kymriah (CAR-T cell) therapy

**Following Kymriah treatment, Cytokine Release Syndrome (CRS) can happen. It may include neurological toxicities.** 

**Please contact his/her treating oncologist in the following situations:**

- before giving steroids or cytotoxic medications
- if the patient has a serious infection
- before the patient undergoes an invasive procedure

fold

fold

Date received Kymriah: \_\_\_\_\_

Oncologist Name (for Kymriah therapy): \_\_\_\_\_

Phone Number: \_\_\_\_\_

Kymriah is a CD19-directed genetically modified autologous T Cell immunotherapy indicated for the treatment of patients up to 25 years of age with B-cell precursor acute lymphoblastic leukemia (ALL) that is refractory or in second or later relapse and adult patients with relapsed or refractory (r/r) large B-cell lymphoma after two or more lines of systemic therapy including diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL) not otherwise specified, high grade B-cell lymphoma and DLBCL arising from follicular lymphoma.

Limitation of Use: KYMRIAH is not indicated for treatment of patients with primary central nervous system lymphoma

 **KYMRIAH**<sup>®</sup>  
(tisagenlecleucel) Suspension for IV infusion

## INFORMACIÓN PARA PROVEEDORES DE ATENCIÓN MÉDICA

Este paciente ha recibido terapia con Kymriah (células T y CAR)

**Luego del tratamiento con Kymriah, puede producirse el síndrome de liberación de citocinas (Cytokine Release Syndrome, CRS). Puede incluir toxicidades neurológicas.** 

**Comuníquese con el oncólogo que lo trata en las siguientes situaciones:**

- Antes de administrar esteroides o medicamentos citotóxicos.
- Si el paciente tiene una infección grave.
- Antes de que el paciente se someta a un procedimiento invasivo.

fold

fold

Fecha en la que recibió Kymriah: \_\_\_\_\_

Nombre del oncólogo (para la terapia con Kymriah): \_\_\_\_\_

Número de teléfono: \_\_\_\_\_

Kymriah es una inmunoterapia a base de células T autólogas modificadas genéticamente dirigida contra CD19, indicada para el tratamiento de pacientes de hasta 25 años con leucemia linfoblástica aguda (acute lymphoblastic leukemia, ALL) precursora de células B refractoria o que tuvo una segunda recidiva, o más, y de pacientes adultos con linfoma de células B grandes refractorio o en recidiva (r/r) luego de dos o más líneas de terapia sistémica que incluye linfoma difuso de células B grandes (diffuse large B-cell lymphoma, DLBCL) no especificado de otra forma y linfoma de células B de alto grado y DLBCL provocados por el linfoma folicular.

Limitación de uso: KYMRIAH no está indicado para el tratamiento de pacientes con linfoma del sistema nervioso central primario.

 **KYMRIAH**<sup>®</sup>  
(tisagenlecleucel) Suspension for IV infusion